

Resúmenes Ponencias XII Congreso Bolivariano de la FILACP

Evaluación comparativa de las complicaciones en abdominoplastia entre pacientes post bariátricos y pacientes no post bariátricos.

.....

Dra. Vanessa Jordán Ledezma
Cirugía Plástica

RESUMEN

Introducción

La mama tuberosa es sin lugar a duda una malformación o anomalía congénita evidenciada durante el La abdominoplastia es uno de los procedimientos estéticos más realizados en todo el mundo. Esta tiene un papel vital en la reconstrucción del paciente post bariátrico removiendo los tejidos redundantes, para brindar al paciente un contorno corporal armonioso y eliminar las secuelas de la pérdida de peso masiva.

Objetivo: Este trabajo tiene por objeto comparar las complicaciones posteriores a una abdominoplastia entre pacientes post bariátricos con un grupo control y evaluar si existen diferencias entre estos.

Métodos

Fueron analizados prospectivamente 94 pacientes sometidos a abdominoplastia clásica.

Resultados

Se analizó la incidencia de complicaciones en ambos grupos y se constató que el índice de complicaciones es mayor en el grupo de pacientes post bariátricos con un 40% en comparación con el grupo control que tuvo una incidencia de complicaciones de 30.6%. Se constató que existe 1.8 veces más probabilidad de ocurrir una complicación en pacientes post bariátricos, con un intervalo de confiabilidad de 95%. Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos con relación a la incidencia de seroma, siendo este porcentaje de 26,6% para los pacientes post bariátricos frente a un 6,1% para el grupo control. También se encontró diferencia estadísticamente significativa para el tiempo de permanencia del drenaje y en relación a la presentación de más de una complicación por paciente. Se encontró que 78,78% de los pacientes que presentaron una complicación pertenecieron al grupo de pacientes operados con IMC mayor a 25 kg/mt2 independientemente si son del grupo de pacientes post bariátricos o el grupo control. Conclusiones: Es nuestro deber informar al paciente post bariátrico en el período pre operatorio, de la posibilidad de tener un mayor índice de complicaciones. Se deben realizar más trabajos prospectivos para determinar el verdadero impacto de las complicaciones en abdominoplastia en la población post bariátrica.